

RHUMATOLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet :

Mme X ..., âgée de 54 ans, ménopausée depuis 3 ans, sans aucun antécédent pathologique consulte en raison de douleurs articulaires bilatérales, symétriques, d'horaire inflammatoire intéressant les poignets, les 2^{èmes} et 3^{èmes} métacarpophalangiennes et les avant-pieds, évoluant depuis 3 mois.

Question 1 :

Quels sont les éléments cliniques supplémentaires que vous recherchez en faveur du diagnostic de Polyarthrite Rhumatoïde ?

Question 2 :

Quels sont les éléments biologiques que vous recherchez en faveur du diagnostic de Polyarthrite Rhumatoïde ?

Question 3 :

Quels sont les éléments radiographiques que vous recherchez, en première intention, en faveur du diagnostic de Polyarthrite Rhumatoïde ?

Question 4 :

Le diagnostic de Polyarthrite Rhumatoïde est affirmé. Un traitement par des anti-inflammatoires non stéroïdiens est réalisé, à dose adaptée. Vous décidez de débiter un traitement de fond. Justifiez votre décision.

Question 5 :

Quel est le traitement de fond de référence dans cette situation ?

Question 6 :

Rédigez

- (a) l'ordonnance pour le bilan pré-thérapeutique
- (b) l'ordonnance pour le traitement de fond choisi
- (c) l'ordonnance pour le suivi biologique du traitement choisi

Question 7 :

Un an plus tard, la patiente signale une amélioration transitoire des douleurs entre le 3^{ème} et le 9^{ème} mois puis une rechute douloureuse intéressant les genoux et le poignet gauche. Le traitement de fond a pourtant été utilisé à la dose optimale. L'examen clinique montre 8 synovites. Les radiographies montrent l'apparition d'érosions de la 2^{ème} MCP droite et de la 5^{ème} MTP gauche. La CRP est dosée à 42 mg par litre.

Quel score d'activité peut-on utiliser pour confirmer la rechute ? Quels sont les items de ce score ?

Question 8 :

En tenant compte de cette évolutivité évidente, quel nouveau traitement de fond proposez-vous à la patiente ?

Question 9 :

Quel bilan préthérapeutique est nécessaire avant la mise en route de ce traitement ?

Question 10 :

Quel risque principal est associé à l'utilisation de cette thérapeutique ?