

SAGE-FEMME

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet :

Mme X âgée de 35 ans est enceinte pour la deuxième fois

Dans les antécédents on note :

Une césarienne prophylactique pour présentation du siège et une hypertension artérielle traitée médicalement et stable.

Elle est Rhésus négatif, immunisée contre la toxoplasmose mais pas contre la rubéole. La recherche d'antigène HBs est négative, la sérologie HIV est négative, la recherche de streptocoque B au 8ème mois est négative.

La tension artérielle était à 13/8 au 9ème mois. Un accouchement par voie basse était autorisé à la visite du 9ème mois

- 1°) La patiente arrive à la maternité avec des contractions, à 20h, à 39 semaines.
A l'examen : HU : 27 cm, PC fixée (-1), col effacé à 3cm, centré, souple, SI+, PI+, PE intacte.
Que faire à l'entrée ?
- 2°) La voie basse est acceptée
Quelles sont les complications possibles ?
- 3°) La dilatation stagne à 6cm, sans anomalie du Rythme Cardiaque Foetal.
Quels diagnostics évoquer ?
- 4°) Une heure plus tard la patiente présente une hémorragie
A quels diagnostics devez-vous penser ?
- 5°) La patiente a une césarienne, puis allaite son enfant.
L'enfant pèse 2800g à la naissance, avec un Apgar à 10 à 3mn
Quels examens devez-vous faire à la naissance ?
- 6°) Au 3ème jour après la naissance la patiente a une fièvre à 38°.
Quelles pathologies devez-vous rechercher chez la mère ?
- 7°) La patiente quitte la maternité au 7ème jour après la naissance.
Quel traitement devez-vous prescrire à la patiente (en fonction des éléments donnés dans l'énoncé) ?
Quelle contraception pouvez-vous proposer au départ ?