

CHIRURGIE INFANTILE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Tous les sujets sont à traiter

Sujet N° 1

Un jeune garçon de 14 ans est admis à 9 heures pour vomissements et douleur testiculaire gauche depuis 6 heures du matin.

A l'examen, la bourse est tendue très sensible difficilement examinable.

Question N° 1 :

Quel est le diagnostic à évoquer en priorité ?

Question N° 2 :

Quelle est votre attitude en urgence ?

Question N° 3 :

Quelles informations donnez-vous au patient et à sa famille avant l'intervention ?

Question N° 4 :

Le diagnostic qui vous a conduit à intervenir s'est confirmé.

Quelles informations supplémentaires devez-vous donner au patient et à sa famille en fonction des différents gestes que vous avez pu réaliser ?

Sujet N° 2

Vous prenez en charge un garçon âgé de trois semaines premier né de la famille ; il présente des vomissements après chaque tétée. Il pèse le même poids qu'à sa naissance.

Question N° 1 :

Quel est votre diagnostic ?

Question N° 2

Quels désordres biologiques sont à prendre en charge avant l'intervention ?

Question N° 3 :

Décrivez les différents temps opératoires.

Question N° 4 :

Quel est la prise en charge post-opératoire au cours des 24 premières heures ?

Question N° 5

Après 48 heures post-opératoires l'enfant continue à régurgiter. Quel est le diagnostic probable ? Quel est le traitement à mettre en place ?

Tous les sujets sont à traiter

Sujet N° 3

Vous recevez aux urgences un garçon âgé 3 ans qui, à la suite d'une chute d'un lit superposé, a présenté une fracture fermée de la diaphyse du fémur gauche.

Question N° 1 :

Quelle est votre attitude de prise en charge dans la période initiale et jusqu'à consolidation de la fracture ?

Question N° 2 :

A quel rythme et comment surveillez-vous cet enfant après consolidation de la fracture ?

Question N° 3 :

A l'âge de 8 ans cet enfant présente une inégalité de longueur de 2 cm aux dépens du membre inférieur droit. Quelle est la surveillance que vous proposez à l'enfant et à sa famille et par quels moyens ?

Question N° 4 :

Quelles sont les différentes possibilités de traitement d'une inégalité de longueur des membres inférieurs dont le pronostic en fin de croissance est de 3 cm.

Sujet N° 4

Vous êtes appelé un vendredi après-midi à 16 heures par le service de pédiatrie pour un nourrisson âgé de 8 mois hospitalisé pour une diarrhée aiguë fébrile.

La maman a signalé à l'équipe soignante que lors du changement des couches l'enfant pleure de façon importante. L'enfant est perfusé depuis 48 heures pour assurer sa réhydratation. A votre arrivée dans le service à 17 heures, il présente 38,5°C de fièvre, malgré une administration de paracétamol à 16 heures.

Dans les antécédents de l'enfant on note une naissance à terme, poids de naissance 3kg450, taille 52 cm, avec la notion d'une rupture prématurée de la poche des eaux, 48 heures avant sa naissance.

Question N° 1 :

Quel est le diagnostic le plus probable que vous suspectez ?

Question N° 2 :

Quels examens complémentaires demandez-vous pour confirmer le diagnostic ?

Question N° 3 :

Votre diagnostic initial est confirmé, quelle est votre stratégie de prise en charge ?

Question N° 4 :

Quelles sont les complications immédiates et à long terme que vous évoquez à la famille ?