

GYNECOLOGIE MEDICALE
LES DEUX SUJETS SONT A TRAITER
Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Mme D a fait une embolie pulmonaire il y a 18 mois, elle avait une contraception oestro-progestative à 15 ug d'éthinyl-oestradiol qui a été arrêtée et a une contraception actuelle par préservatif. Son traitement anticoagulant est terminé, son examen gynécologique est normal avec tension artérielle à 11/6 mmHg et un indice de masse corporel de 23. Elle vous demande une autre contraception :

QUESTION N°1 :

Quel bilan devez-vous récupérer (ou faire) au préalable avant de mettre en place une nouvelle contraception ?

QUESTION N°2 :

Enumérez les contraceptions envisageables

Elle revient vous voir 1 an plus tard sous Cerazette qu'elle oublie régulièrement,

QUESTION N°3 :

Quelles recommandations préconisez-vous pour les oublis de Cerazette ?

QUESTION N°4 :

Quelles solutions lui proposez-vous devant ses oublis de contraception ?

Elle revient vous voir 2 ans après en urgence pour des problèmes de métrorragies, avec un test urinaire de grossesse positif

QUESTION N°5 :

Quel diagnostic évoquez vous ?

QUESTION N°6 :

Quels examens complémentaires demandez-vous?

A l'interrogatoire elle vous dit qu'elle a un retard de règles de 4 semaines, son HCG quantitatif revient à 200 000 UI/l.

QUESTION N°7 :

Quel diagnostic évoquez-vous ?

QUESTION N°8 :

Quels signes échographiques vont confirmer votre diagnostic ?


QUESTION N°9 :

Quelle est votre prise en charge thérapeutique ?

QUESTION N°10 :

Quel délai doit-elle respecter avant de débiter une nouvelle grossesse ?

SUITE AU VERSO



QUESTION N°11 :

Quels sont les conseils pré-conceptionnels à lui fournir ?

Elle revient vous voir après 3 fausses couches précoces,

QUESTION N°12 :

Quel bilan demandez vous ?