

NEUROLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet :

Un homme de 58 ans ayant pour antécédent depuis l'âge de 42 ans un diabète actuellement traité par Lantus 1 injection de 22 unités + Diamicon 30 mg LM, un surpoids 91 kg pour 1,72 et un syndrome anxiodépressif traité par Escitalopram 10 + Temesta ½ mg X 2 depuis son licenciement 3 ans auparavant. Un matin vers 9h 30 sa conjointe le retrouve à terre somnolent ayant chuté devant son lavabo et elle appelle le médecin.

Question N° 1

Quelle est la conduite à tenir par le médecin arrivé en 5 minutes sur place ?

Question N° 2

Quels seraient les arguments dans ce contexte en faveur du diagnostic d'une première crise d'épilepsie ?

Question N° 3

Quels seraient les arguments en faveur d'une origine non épileptique ?

Question N° 4

Quels examens faut-il réaliser s'il s'agit d'une crise d'épilepsie symptomatique en déterminant les critères d'urgence et les délais de réalisation recommandés.

Question N° 5

Quels sont les critères d'instauration d'un traitement par le neurologue après une première crise d'épilepsie ?

Question N° 6

Si ces critères étaient remplis, en l'absence de signe focal, quel traitement est recommandé chez ce patient ?

Question N° 7

Quels éléments d'information et d'éducation transmettez-vous au patient ?