


OPHTALMOLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques **TOUS LES SUJETS SONT A TRAITER**

Sujet : N° 1

Une femme de 27 ans porteuse de lentilles de contact souples se présente à votre consultation pour un œil rouge douloureux et une baisse d'acuité visuelle (compte les doigts à 1 mètre)



Question n° 1

Quel est votre diagnostic ?

Question n° 2

Définissez les critères locaux de gravité de cette affection qui guideront votre prise en charge.

Question n° 3


Détaillez la prise en charge de cette patiente (diagnostique et thérapeutique).

Question n° 4

Vous notez la présence d'un hypopion.

Procédez-vous oui ou non à sa ponction, à visée diagnostique ou thérapeutique ?

Justifiez votre attitude en cas de réponse positive ou négative.




Question n° 5

Citez 2 traitements adjuvants possibles en cas d'abcès cornéen sévère.

Sujet : N° 2

Un homme de 55 ans, plombier, reçoit une projection de soude caustique.



Question n° 1

Quel geste préconisez-vous en urgence ?

Quel liquide utilisez-vous et quelles précautions prenez vous ?


Question n° 2

Sur quels critères allez-vous estimer le degré de gravité de cette brûlure ?

Quelle classification allez-vous utiliser ? / Décrire brièvement ses critères et son intérêt.

Question n° 3


Votre examen en Lampe à fente conclue à ne brûlure sévère de la surface oculaire (Grade III) / décrivez votre prise en charge thérapeutique.



Sujet : N° 3

Mr M. 30 ans, sans antécédent généraux, familiaux a été opéré de décollement de la rétine de l'œil droit 3 semaines auparavant. Il présente une baisse d'acuité visuelle depuis 3 jours de l'œil gauche avec une vision à droite à 1/10 avec correction -4(-0.50x150°) et à l'oeil gauche une vision à 1/20è avec : -0.50(-0.75x35°). La rétine de l'œil droit est à plat, la cavité vitréenne à droite est claire sans tamponnement interne retrouvé.

Les examens d'imagerie rétinienne réalisés sont représentés ci-après :



Question n° 1

Quel tamponnement interne a certainement été utilisé pour traiter le décollement de la rétine d'après vous ?

Question n° 2

Quel diagnostic recherchez-vous ?

Question n° 3

Sur quels arguments ?

Question n° 4


Quels sont les signes présents en segment antérieur de l'œil gauche dans ce cas ?

Question n° 5

Quel est le traitement ?


Question N° 6

Si les 2 yeux présentaient le même tableau clinique en imagerie rétinienne, quel diagnostic suspecter ?



Sujet : N° 4

Mme C. 56 ans consulte pour baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil droit à 1/20^e avec correction. L'œil gauche est normal avec une vision à 10/10^e sans correction. L'image du fond d'œil est ci-après :



Question n° 1


Quel est le diagnostic ?

Question n° 2

Quel examen biologique demandez-vous en urgence ?

Sujet : N° 5

Suivi et propositions thérapeutiques devant un strabisme divergent intermittent chez un jeune adulte.



Sujet : N° 6

Question n° 1

Un patient de 72 ans consulte pour une diplopie horizontale depuis 24h associée à des céphalées latéralisées à la tempe gauche. Quel examen demandez vous en priorité et dans quel délai ?

Question n° 2

Un patient de 26 ans consulte pour un ptosis apparu 24h auparavant. Quel élément clinique allez vous analyser en priorité ?

Question n° 3

Un patient de 32 ans consulte pour sensation de flou visuel et diplopie intermittante. Vous notez un oedème papillaire bilatéral au fond d'œil. Quel examen demandez vous et dans quel délai ?

Question n° 4

Devant un oedème papillaire bilatéral, quels sont les 2 diagnostics à éliminer en urgence devant ce tableau clinique ?

Question n° 5

Une patiente de 22 ans sans antécédents particuliers consulte pour une baisse d'acuité visuelle rapidement progressive depuis 4 jours de l'œil droit. Elle ressent des douleurs à la mobilisation du globe, l'acuité visuelle est à 3/10 OD et 10/10 OG mais l'examen à la lampe à fente et le fond d'œil sont normaux. Quel est votre diagnostic ?

Question n° 6

Quel examen complémentaire demander vous et pourquoi ?

Question N° 7

Pour cette patiente de 22 ans, quel traitement proposez- vous ?

Sujet : N° 7

Conduite à tenir devant une endophtalmie post-opératoire ?