

PEDIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question N°1

Quelles sont les 10 circonstances de diagnostic clinique d'une leucémie aigue chez l'enfant ?

Question N°2

Quelles sont les causes d'anémie arégénérative chez l'enfant ?

Question N°3

Kevin est amené aux urgences pour une crise généralisée tonico-clonique persistante. Il a 4 ans.

Donnez les traitements possibles de la crise convulsive aux urgences en première ligne, avec leur posologie initiale et leur mode d'administration: Donnez les traitements possibles de la crise convulsive aux urgences en deuxième ligne, avec leur posologie initiale et leur mode d'administration.

Question N°4


Donnez les 5 critères de convulsions fébriles complexes :

Question N°5

Citez les 3 principaux critères diagnostiques liés à l'autisme infantile et donnez 2 syndromes génétiques source d'autisme infantile :

Question N°6

Citez 5 acquis psychomoteurs d'un nourrisson de 9 mois :



Question N°7

Vous êtes appelé en salle de naissance pour une césarienne en urgence à 39 semaines réalisée pour altération du rythme cardiaque fœtal (bradycardie profonde depuis 8 min). Un hématome rétroplacentaire est retrouvé. Le liquide est clair. L'enfant naît aréactif, hypotonique, pale, avec une fréquence cardiaque à 40 battements/min. Décrivez les étapes de la réanimation dans l'ordre chronologique en cas de non réponse aux étapes précédentes :

Question N°8

Un enfant de 6 jours est adressé aux urgences pour difficultés de prise alimentaire avec mauvaise prise pondérale. A l'examen clinique vous le trouvez polypnéique, tachycarde. L'infirmière n'arrive pas à prendre la TA aux membres inférieurs mais la TA artérielle est à 120/80 au membre supérieur droit. Quel est le premier élément clinique à rechercher ? Quel est le premier diagnostic à évoquer ? Quel est le premier examen complémentaire qui permettra de confirmer votre diagnostic ?

Question N°9

Quels sont les signes cliniques évocateurs d'un sepsis grave chez un enfant de 2 ans fébrile ?

Question N°10

Quels sont les critères cliniques d'hospitalisation d'une bronchiolite du nourrisson ?

Question N°11

Quel est le bilan biologique de première intention devant une cytolyse avec des transaminases à 10 fois la normale, de découverte fortuite, chez un enfant de 5 ans, sans antécédent.

Question N°12

Quelles sont les maladies dépistées par le test sanguin de dépistage néonatal sur papier buvard ?

Question N°13

Quel bilan de débrouillage initial faites-vous devant une petite taille à -2DS chez un enfant de 5 ans sans orientation clinique particulière ? Quelles sont les indications de la GH ?

Question N°14

Au-dessous de quel âge définit-on la puberté précoce chez les filles et les garçons?

Quels sont les signes cliniques qui font évoquer le diagnostic de puberté précoce d'origine centrale ?

Comment cote-t-on les stades pubertaires ?

Quels examens faites-vous en 1ere intention chez la fille pour confirmer le diagnostic de puberté précoce?

Quel est le médicament utilisé pour freiner une puberté précoce centrale ?

Question N°15

Quels sont les signes cliniques évocateurs du diabète de type 1 de l'enfant au stade précoce, puis au stade avancé ?

Quelle est votre démarche en urgence en cabinet libéral devant des symptômes cliniques évoquant un diabète ?

Quel est le critère biologique de bon équilibre d'un enfant diabétique traité ?