

PSYCHIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question N°1

Facteurs d'évolution favorable d'un premier épisode psychotique aigu ?

Question N°2

Signes cliniques en faveur d'un syndrome malin des neuroleptiques.

Question N°4

Surveillance somatique (clinique et biologique) d'un patient sous antipsychotique au long cours.

Question N°3

Citez cinq éléments de surveillance somatique d'un patient en isolement thérapeutique sans contention.

Question N°5

Citez et nommer explicitement (pas d'abréviation) les différents modes d'hospitalisation en psychiatrie.

Question N°6

Surveillance biologique d'un patient traité par Lithium au long cours.

Question N°7


Citez 3 classes de médicaments thymorégulateur dans le traitement de fond du trouble bipolaire.

Question N°8

Citez trois complications psychiatriques du post-partum.

Question N°9

Citez deux complications majeures du syndrome de sevrage alcoolique.



Question N°10

Citez la triade du surdosage aux opiacés.

Question N°11

Citez trois classes de médicaments dans l'aide au sevrage du tabac.

Question N°12

Règles de prescription du zolpidem (Stilnox).

Question N°13

Citez au moins quatre signes précoces d'un trouble du spectre de l'autisme chez un enfant de 18 à 24 mois ? Citez l'outil de référence recommandé pour le dépistage.

Question N°14

Citez les publics cibles des interventions non médicamenteuses dans le TDAH chez l'enfant, et donnez un exemple d'intervention par public.

Question N°15

Quelles sont les pathologies anxieuses susceptibles d'entraîner un refus scolaire anxieux ?

Question N°16

Quels sont les 3 principaux signes cliniques du TDAH chez l'enfant d'âge scolaire ?

Question N°17

Principaux symptômes de l'anxiété de séparation chez l'enfant ?

Question N°18

Citez cinq facteurs du risque suicidaire chez l'adolescent.

Question N°19

Citez les deux modes de signalement d'une suspicion de maltraitance d'un enfant.

Question N°20

Quels sont les éléments cliniques du PTSD (de l'état de stress Post traumatique) chez l'adulte selon la CIM 10 ?